

GlucoMotion® UC-II®

Voedingssupplement GlucoMotion® UC-II®

Samenstelling	Dagdosering*	RI**
Vitamine C (als calciumascorbaat)	80 mg	100%
Collageen UC-II®	40 mg	
(waarvan 10 mg ongedenatureerd)		
Vitamine D3 (als cholecalciferol)	5 µg	50%

Ingrediënten

Mc cellulose (vulmiddel), vitaminen, gelatine, collageen, talk (antiklontermiddel), magnesiumstearaat (plant-aardig antiklontermiddel), titaandioxide (kleurstof).

Allergeen informatie

Bevat geen gluten, gist, lactose, suiker, kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen of conserveermiddelen.

* Dagelijkse dosering op basis van 1 capsule

** RI = Referentie-inname.



UC-II® is a trademark of InterHealth N.I.

UC-II® brand undenatured type II collagen (U.S. Patents 5,645,851 5,637,321, 5,529, 786 and 5,750,144).

Merkhouder | Distributeur

Vitalize | Galvaniweg 15

4207 HL Gorinchem | Nederland

Tel: +31 (0)183 699 450

E-mail: info@vitalize.nl | Web: www.vitalize.nl

GlucoMotion® UC-II® is een uitgebalanceerde combinatie van diverse ingrediënten waaronder vitamine C en vitamine D.

Vitamine C (calciumascorbaat) is één van de meest bekende en gebruikte antioxidanten, die ter bescherming dient tegen vrije radicalen. Vitamine C draagt o.a. bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van het kraakbeen.

Vitamine D helpt om calcium uit de voeding op te nemen en is daarom belangrijk voor het handhaven van o.a. stevige botten. De belangrijkste vorm is cholecalciferol (vitamine D3).

Ongedenatureerd collageen type II wordt op een lage temperatuur zonder enzymatisch proces gefabriceerd waarbij de molecuulstructuur behouden blijft. Het proces van het vervaardigen van UC-II® is wereldwijd gepatenteerd door InterHealth N.I. (USA).

GlucoMotion® UC-II®

Wat u moet weten voordat u GlucoMotion® UC-II® gaat gebruiken

Gebruik GlucoMotion® UC-II® niet:

- indien u overgevoelig of allergisch bent voor een van de bestanddelen van GlucoMotion® UC-II®;
- indien u zwanger bent of wilt worden. Vraag uw arts om advies voordat u dit middel gebruikt;
- indien u borstvoeding geeft of gaat geven. Vraag uw arts om advies voordat u dit middel gebruikt.

Het gebruik in combinatie met andere middelen

- Wees kritisch op het totaal aan vitamines en mineralen dat u per dag door middel van supplementen binnenkrijgt. Kijk voor alle maximale dagdoseringen op www.vitalize.nl.
- Raadpleeg bij twijfel over het gebruik van GlucoMotion® UC-II® in combinatie met andere middelen altijd eerst uw arts.

Hoe wordt GlucoMotion® UC-II® ingenomen?

- Eénmaal daags één capsule een half uur voor het ontbijt of voor het slapen gaan met water innemen.
- De duur van gebruik kan naar behoefte worden verlengd.
- De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.

Wat moet u doen als u GlucoMotion® UC-II® een (paar) keer vergeet te gebruiken?

- Vervolg uw normale innamepatroon. Neem geen extra dosering om een overgeslagen dosering in te halen.

Hoe bewaart u GlucoMotion® UC-II®?

- Buiten het bereik van jonge kinderen houden.
- Donker en droog bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
- In de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.
- Niet gebruiken na de op het doosje vermelde uiterste gebruiksdatum.
- Gebruik GlucoMotion® UC-II® niet als u constateert dat de capsules sterk verkleurd zijn.

Wilt u meer weten over GlucoMotion® UC-II®?

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot de klantenservice van Vitalize.

Tel: +31 (0)183 699 450 | e-mail: info@vitalize.nl
of maak gebruik van de chatfunctie op www.vitalize.nl

Overige informatie

GlucoMotion® UC-II® is een voedingssupplement dat met de grootste zorg is samengesteld en volgens wetenschappelijke inzichten is ontwikkeld. Geproduceerd onder GMP (Good Manufacturing Practice).

Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.

Deze gebruiksaanwijzing is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts.