

CHLOORHEXIDINE MONDSPOELING 0,2%

Chloorhexidine mondspoeling 0,2% is een mondspoeling die de mondhygiëne ondersteunt en helpt het tandvlees te verzorgen in situaties dat tandenpoetsen niet goed mogelijk is, zoals na behandeling van tandvleesaandoeningen, na chirurgische ingrepen in de mond en na extracties.

Chloorhexidine mondspoeling 0,2% bevat chloorhexidine en alcohol. Chloorhexidine werkt ontsmettend en remt de vorming van tandplak. Alcohol is een oplosmiddel en draagt bij aan de ontsmettende werking van chloorhexidine.

Ingrediënten

Gezuiverd water, sorbitol, alcohol, chloorhexidinegluconaat, pepermuntolie.

Wanneer niet gebruiken

Gebruik Chloorhexidine mondspoeling 0,2% niet, als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van dit product. Er zijn tot op heden geen meldingen geweest van wisselwerking met geneesmiddelen.

Neveneffecten

Tong, tanden, vullingen en prothesen kunnen bruin verkleuren door gebruik van Chloorhexidine mondspoeling 0,2%. De kleur verdwijnt meestal vanzelf als u deze mondspoeling niet meer gebruikt. Eventueel kan de tandarts of mondhygiënist het gebit reinigen.

De verkleuring is sterker als u vlak voor het gebruik van Chloorhexidine mondspoeling 0,2% thee, koffie of rode wijn hebt gedronken. U kunt dit tegengaan door het gebruik van dit soort stoffen te vermijden of te verminderen of door de tanden te poetsen vóór het gebruik van deze mondspoeling.

Bij het gebruik van Chloorhexidine mondspoeling 0,2% kunnen een aantal plaatselijke neveneffecten voorkomen, zoals droog mondslijmvlies. Daarnaast kan de tong branderig aanvoelen en kunnen er smaakveranderingen optreden. Zowel bij stoppen met het gebruik als bij langduriger gebruik verdwijnen deze verschijnselen meestal.

Zeer zelden is er een zwelling gemeld bij de speekselklieren onder het oor, die in alle gevallen verdween na het stoppen met het gebruik.

Als de neveneffecten aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik

Tenzij door uw (tand)arts anders voorgeschreven, tweemaal per dag de mond gedurende 1 minuut met 10 ml mondspoeling (maatdop bijgesloten) spoelen. Niet doorslikken. In de regel wordt Chloorhexidine mondspoeling 0,2% tijdelijk (meestal niet langer dan 1 maand) gebruikt, tenzij door uw (tand)arts anders voorgeschreven.

Tandpasta kan het effect van chloorhexidine teniet doen. Spoel daarom de mond goed met water na het tandenpoetsen en gebruik daarna pas de mondspoeling. Of gebruik eerst de mondspoeling en wacht daarna minimaal een half uur voordat u de tanden poetst.

Draagt u een kunstgebit, neem dit dan uit voordat u de mond spoelt. Het kunstgebit moet u op de gebruikelijke manier reinigen en vervolgens een kwartier in de mondspoelvloeistof leggen.

Gebruik Chloorhexidine mondspoeling 0,2% niet voor kleine kinderen, omdat zij nog niet goed kunnen uitspugen en de neiging hebben de mondspoeling door te slikken. Bij inname van een grote hoeveelheid: veel melk (laten) drinken en een arts waarschuwen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik Chloorhexidine mondspoeling 0,2% alleen in de mond. Als de mondspoeling in de ogen of oren terecht komt, dan direct met veel water uitspoelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, kunt u deze mondspoeling zonder bezwaar gebruiken.

Rijvaardigheid

Deze mondspoeling heeft geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Bewaren

Bewaar Chloorhexidine mondspoeling 0,2% buiten bereik en zicht van kinderen en beneden 25°C, niet in de vriezer. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld na 'tenminste houdbaar tot einde'. Na openen van de verpakking is dit product nog 6 maanden houdbaar. Sluit de flacon na gebruik goed af.

Bipharma 'gaat voor de inhoud'

Met de keuze voor het Bipharma assortiment dranken en mondspoelingen hebt u een hoogwaardig product in handen van farmaceutische kwaliteit. Bipharma producten bevatten geen kleurstoffen en zijn niet op dieren getest.

Melden

Uw ervaring met dit product is waardevol voor anderen en kan helpen informatie over dit of soortgelijke producten te verbeteren.

Meld deze ervaring daarom via onze website, www.bipharma.com.

Deze gebruiksaanwijzing is voor de laatste keer bijgewerkt in augustus 2018.

