

## Chloorhexidine mondspoeling 0,2%

Voordat u of uw kind dit product gebruikt is het belangrijk dat u deze productinformatie goed doorleest. Vraag indien nodig uw apotheker of (huis-)arts om meer informatie of advies.

### Samenstelling

Aqua, Sorbitol, Alcohol, Chlorhexidine Digluconate, Mentha Arvensis Leaf Oil, Anethole, Eucalyptol, Mentha Piperita Oil, Menthol.

### Toepassing en gebruik

Ter behandeling van mondinfecties of ter voorkoming van tandplak indien poetsen niet mogelijk is. Meet met de maatbeker de voorgeschreven hoeveelheid af, meestal tweemaal daags 15 ml, en spoel hiermee de mond. Stuw en zuig de vloeistof goed tussen de tanden en kiezen door en spuug de vloeistof daarna uit. NIET DOORSLIKKEN. Gebruik tandpasta pas minimaal 30 minuten na gebruik van de mondspoeling.

### Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De bijwerkingen zijn plaatselijk. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

#### *Soms*

- Tong, tanden, vullingen en prothesen kunnen geelbruin tot zwartbruin verkleuren. De kleur verdwijnt meestal vanzelf wanneer u geen chloorhexidinedigluconaat meer gebruikt. Zo niet, dan kan de tandarts de verkleuring verhelpen. De verkleuring is sterker als u vlak voor het gebruik van chloorhexidinedigluconaat thee, koffie of rode wijn heeft gedronken. U kunt deze verkleuring tegengaan door na thee, koffie of rode wijn uw tanden te poetsen voordat u chloorhexidinedigluconaat gebruikt.

#### *Zelden*

- Branderig aanvoelende tong.
- Droog mondslijmvlies.
- Veranderingen van smaak, dit gaat vanzelf over als u dit middel niet meer gebruikt.

Raadpleeg uw (tand)arts of apotheker als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

De mondspoeling is niet geschikt voor kleine kinderen, zij hebben de neiging het door te slikken. Berg het zo op dat zij er niet bij kunnen.

### Gebruik met andere geneesmiddelen

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

### Gebruik bij zwangerschap

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

### Gebruik bij borstvoeding

U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

**Houdbaarheid en bewaaradvies**

Ten minste houdbaar tot einde: zie etiket. Na deze datum kan de kwaliteit van het product niet meer gewaarborgd worden.

Na openen: 6 maanden houdbaar.

Bij kamertemperatuur bewaren.

Buiten bereik van kinderen houden.

Sluit de fles na gebruik goed af.

**Verkrijgbaarheid**

Dit middel is zonder recept bij de apotheek te verkrijgen.

**Aanvullende informatie**

LIVSANE

Straatweg 2

3604 BB Maarssen

Dit product en bijbehorende informatie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Deze productinformatie dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw (huis-)arts.