

Tijm Elixer Hoestdrankmakers

INFORMATIE OVER DIT MIDDEL

Lees onderstaande informatie goed door voor u het middel gaat gebruiken!

Indien u iets niet duidelijk is, vraag dan uw apotheek of apotheker om uitleg of ga naar onze website www.bronpharma.com of www.bronpharma.nl

Inhoudsopgave

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Samenstelling | 7. Dosering |
| 2. Toepassing | 8. Bent u zwanger of heeft u kinderwens? |
| 3. Werking | 9. Geeft u borstvoeding? |
| 4. Gebruik dit middel NIET | 10. Combinatie met geneesmiddelen |
| 5. Mogelijke bijwerkingen | 11. Bewaring |
| 6. Gebruiksaanwijzing | 12. Extra informatie over hoest |

1. Samenstelling

Tijm Elixer is speciaal voor u gemaakt. Deze bevat de volgende bestanddelen:

- vloeibaar extract van de tijmplant (15%)

Verder bestaat het tijmsiroop uit de volgende hulpstoffen:

- suiker, natriumbenzoaat, kaliumsorbaat, citroenzuur en water

2. Toepassing

Tijm Elixer wordt toegepast om een weldadig en verzachtend gevoel aan de keel te geven.

3. Werking

De tijm heeft zowel een verzachtend effect op de keel als de luchtwegen.

4. Gebruik dit middel NIET:

- als u bij een eerder gebruik van middelen met tijm overgevoeligheidsreacties heeft gehad, zoals huiduitslag.
- als u suikerziekte heeft, omdat deze drank veel suiker bevat.
- bij ernstige leveraandoening of nieraandoening. Raadpleeg dan uw arts.

5. Mogelijke bijwerkingen

Over het algemeen wordt dit middel goed verdragen. Onderstaande bijwerkingen kunnen soms optreden bij daarvoor gevoelige personen. Deze zijn meestal licht van aard. Neem contact op met uw arts, als u wel veel hinder van de bijwerkingen ondervindt of als u andere hinderlijke bijwerkingen ervaart. Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker

Zelden: maag-darmklachten en diarree

6. Gebruiksaanwijzing

Als u Tijm Elixer HM een keer vergeet in te nemen, moet u dit alsnog doen. Wanneer het bijna tijd is voor de volgende toediening wacht u dit af en gebruikt u de normale hoeveelheid. Als u per ongeluk teveel drank hebt ingenomen of als u kind van de drank heeft gesnoept, moet u contact opnemen met uw arts.

Helpt Tijm Elixer niet binnen 5 dagen of herhalen de klachten zich, dan moet u advies vragen aan uw arts.

7. Dosering

- Kinderen van 6 maanden tot 2 jaar: 2 tot 3x daags 5 milliliter = 1 theelepel
 - Kinderen van 2 tot 6 jaar: 3 tot 6x daags 5 milliliter = 1 theelepel
 - Kinderen van 6 tot 12 jaar: 3 tot 6x daags 10 milliliter = 1 eetlepel
 - Kinderen > 12 jaar en Volwassenen: 3 tot 6x daags 15 milliliter = 1 eetlepel
 - niet langer dan 14 dagen gebruiken onder een arts te raadplegen
 - behalve als uw arts anders heeft voorgeschreven.
-

8. Bent u zwanger of heeft u kinderwens?

Dit middel is veilig te gebruiken als u zwanger bent of als u zwanger wilt worden.

9. Geeft u borstvoeding?

Dit middel kan veilig worden gebruikt door vrouwen, die hun kind borstvoeding geven.

10. Combinatie met geneesmiddelen

Tijm Elixer HM kan zonder problemen worden gecombineerd met andere geneesmiddelen.

11. Bewaring

Sluit de fles na gebruik goed af. Dit voorkomt bederf. Bewaar Tijm Elixer HM buiten invloed van zonlicht bij kamertemperatuur. Tijm Elixer HM is na opening 6 maanden houdbaar, ongeopend tot de datum die op het etiket is vermeld.

Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij uw drogist en/of apotheker in uw buurt of stel uw vragen in onze webshop www.bronpharma.nl

12. Extra informatie over hoest

Door te hoesten worden de luchtwegen gereinigd. Hoest ontstaat door een prikkeling van de luchtwegen veroorzaakt door rook, stof of diverse chemische stoffen. Maar ook een ontsteking of infectie aan de luchtwegen en het gebruik van bepaalde medicijnen kan veroorzaken.

Bij een productieve hoest wordt slijm opgehoest. Men spreekt dan ook wel van "slijmhoest". Gaat een slijmhoest gepaard met koorts, dan is er bijna altijd sprake van een luchtweginfectie.

Komt er geen slijm vrij bij het hoesten, dan spreekt men van "kriebelhoest" of "droge hoest".

Kriebelhoest is meestal het gevolg van een virusinfectie (verkoudheid, griep) of roken.

Door vaak hoesten ontstaat meestal een schrale keel en een schorre stem. Nog meer hoest kan hiervan weer het gevolg zijn.

Tekst BrOn Pharma (versie sept 2017)