

CHLOORHEXIDINE MONDSPOELING 0,12% ZONDER ALCOHOL + 0,05% CPC

Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC is een mondspoeling die de mondhygiëne ondersteunt en helpt het tandvlees te verzorgen in situaties dat tandenpoetsen niet goed mogelijk is, zoals na behandeling van tandvleesaandoeningen, na chirurgische ingrepen in de mond en na extracties. Daarbij doodt de chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC, veel van de bacteriën in de mondholte, die ontsteking of tandbederf (gaatjes) kunnen veroorzaken.

Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC bevat chloorhexidine en cetylpyridinium chloride. Chloorhexidine werkt ontsmettend en remt de vorming van tandplak. Cetylpyridinium chloride is een antimicrobieel middel met een ontsmettende werking.

Ingrediënten

aqua, hydrogenated starch hydrolysate, propylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, glycerin, menthol, chlorhexidine digluconate, cetylpyridinium chloride, mentha piperita extract, citric acid, sucralose, xylitol.

Wanneer niet gebruiken

Gebruik Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC niet, als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van dit product. Er zijn tot op heden geen meldingen geweest van wisselwerking met geneesmiddelen.

Neveneffecten

Tong, tanden, vullingen en prothesen kunnen bruin verkleuren door gebruik van Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC. De kleur verdwijnt meestal vanzelf als u deze mondspoeling niet meer gebruikt. Eventueel kan de tandarts of mondhygiënist het gebit reinigen.

De verkleuring is sterker als u vlak voor het gebruik van Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC thee, koffie of rode wijn hebt gedronken. U kunt dit tegengaan door het gebruik van dit soort stoffen te vermijden of te verminderen of door de tanden te poetsen vóór het gebruik van deze mondspoeling.

Bij het gebruik van Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC kunnen een aantal plaatselijke neveneffecten voorkomen, zoals droog mondslimvlies. Daarnaast kan de tong branderig aanvoelen een kunnen er smaakveranderingen optreden. Zowel bij stoppen met het gebruik als bij langduriger gebruik verdwijnen deze verschijnselen meestal.

Zeer zelden is er een zwelling gemeld bij de speekselklieren onder het oor, die in alle gevallen verdween na het stoppen met het gebruik.

Als de neveneffecten aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik

Tenzij door uw (tand)arts anders voorgeschreven, tweemaal per dag de mond gedurende 1 minuut met 10 ml mondspoeling spoelen. Niet doorslikken.

In de regel wordt Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC tijdelijk (meestal niet langer dan 1 maand) gebruikt, tenzij door uw (tand)arts anders voorgeschreven.

Tandpasta kan het effect van chloorhexidine teniet doen. Spoel daarom de mond goed met water na het tandenpoetsen en gebruik daarna pas de mondspoeling. Of gebruik eerst de mondspoeling en wacht daarna minimaal een half uur voordat u de tanden poetst.

Draagt u een kunstgebit, neem dit dan uit voordat u de mond spoelt. Het kunstgebit moet u op de gebruikelijke manier reinigen en vervolgens een kwartier in de mondspoelvloeistof leggen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC niet voor kinderen onder de 5 jaar, omdat zij nog niet goed kunnen uitspugen en de neiging hebben de mondspoeling door te slikken. Bij inname van een grote hoeveelheid: veel melk (laten) drinken en een arts waarschuwen.

Gebruik Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC alleen in de mond. Als de mondspoeling in de ogen of oren terechtkomt, dan direct met veel water uitspoelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, kunt u deze mondspoeling zonder bezwaar gebruiken.

Rijvaardigheid

Deze mondspoeling heeft geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Bewaren

Bewaar Chloorhexidine mondspoeling 0,12% zonder alcohol + 0,05% CPC buiten bereik en zicht van kinderen en tussen 15°C - 25°C. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld na 'tenminste houdbaar tot einde'.

Na openen van de verpakking is dit product nog 6 maanden houdbaar. Sluit de flacon na gebruik goed af.

Bipharma 'gaat voor de inhoud'

Met de keuze voor het Bipharma assortiment indifferente crèmes en zalven hebt u een hoogwaardig huidverzorgingsproduct in handen van farmaceutische kwaliteit.

Melden

Uw ervaring met dit product is waardevol voor anderen en kan helpen informatie over dit of soortgelijke producten te verbeteren.

Meld deze ervaring daarom via onze website, www.bipharma.com.

Deze gebruiksaanwijzing is voor de laatste keer bijgewerkt in juli 2021.

Bipharma

